



# RELEASE RZ17AB – 0329 CONSULTATIEVE PSYCHIATRIE

## INLEIDING

Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Dit releasedocument bevat de wijzigingen in het DBC pakket per 1 januari 2017. In dit document vindt u de wijzigingen die betrekking hebben op het specialisme Psychiatrie. Bij elke wijziging verwijzen wij u naar het paginanummer in het releasedocument.

## OZP'S

### RZ17A BLZ. 102 - CONSULTATIE BIJ EUTHANASIEVERZOEKEN OP GROND VAN PSYCHISCH LIJDEN

Bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden is extra zorgvuldigheid vereist, onder andere bij de beoordeling van de zorgvuldigheidscriteria 'weloverwogen' en 'uitzichtloosheid'. De NVvP richtlijn 'omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis' beargumenteert uitgebreid de complexiteit van een beoordeling van een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden en beveelt om die reden een consultatie aan door een onafhankelijk psychiater (hier de eerste consultatie genoemd). Deze eerste consultatie vervangt niet het SCEN-consult. Wanneer na de eerste consultatie het euthanasieproces wordt vervolgd, moet alsnog het SCEN-consult plaatsvinden. Er ontbrak echter een passende declaratietitel voor deze specifieke consultatie. Het Zorginstituut Nederland heeft geoordeeld dat het beoordelen van verzoeken tot euthanasie en het eventueel daarna uitvoeren van euthanasie in de eigen omgeving van de patiënt behoort tot de verzekerde zorg, op voorwaarde dat de geldende wetgeving en richtlijnen op het gebied van euthanasie in acht worden genomen.

De opties die binnen de bestaande regelgeving zijn verkend, boden geen bevredigende oplossing. Om die reden heeft de NZa besloten een OZP te introduceren:

Zorgactiviteit	Omschrijving	ZPK	Tarieftype	Tarief
198304	Consultatie bij euthanasieverzoeken op grond van psychisch lijden.	99	12	€190.54



## DIAGNOSE

### RZ17B BLZ. 31 – GESPLITSTE DIAGNOSE

Voor het specialisme 0329 *Consultatieve psychiatrie* is de diagnose 0329\_11 *Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen* gesplitst naar een aparte diagnose voor *Incongruentie genderidentiteit* en een diagnose *Seksuele stoornissen*:

Diagnosecode	Omschrijving	Ingangsdatum	Einddatum	Mutatie
<b>0329_11</b>	Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen	20120101	20161231	Beëindigd
<b>0329_19</b>	Incongruentie genderidentiteit	20170101		Nieuw
<b>0329_20</b>	Seksuele stoornissen	20170101		Nieuw

Diagnose 0329\_20 vervangt diagnose 0329\_11 in de afleiding naar dbc- zorgproducten. Met de nieuwe diagnose 0329\_19 *Incongruentie genderidentiteit* kan worden afgeleid naar de gender dbc-zorgproducten.

De nieuwe diagnose 0329\_19 is in combinatie met zichzelf opgenomen in de diagnose combinatie tabel (dct).

## ZORGACTIVITEIT

### RZ17B BLZ. 31 – INTAKE BIJ INCONGRUENTIE VAN GENDERIDENTITEIT

De psychiater kon geen polikliniekbezoek vastleggen in de intake of diagnostiek fase, omdat er dan wordt afgeleid naar het behandelproduct. De psychiater kan geen polikliniekbezoek alleen vastleggen omdat er dan afleiding plaatsvindt naar het Real Life dbc- zorgproduct.

Daarom is er een zorgactiviteit aangemaakt die de poortspecialisten (zowel psychiater, kinderarts, internist als gynaecoloog) kunnen vastleggen voor de medische en psychologische intake om afleiding naar het dbc-zorgproduct voor screening / intake: 059899066 *Incongruentie genderidentiteit | Intake | Psychische stoornis* te realiseren:

Zorgactiviteit	Omschrijving	Consumentenomschrijving	ZPK	Ingangsdatum	Mutatie
<b>036872</b>	Intake bij incongruentie van genderidentiteit	Intake incongruentie van genderidentiteit	89	20170101	Nieuw

Deze zorgactiviteit heeft waarschijnlijk een tijdelijk karakter omdat voor de nabije toekomst een samenvoeging van dbc-zorgproducten onderzocht wordt waardoor deze zorgactiviteit wellicht niet meer nodig is.

De zorgactiviteit moet vastgelegd worden om afleiding te realiseren. Daarnaast kan vastgelegd worden wat is uitgevoerd: polikliniekbezoek, intake door medisch psycholoog, eventueel andere tests.



Voor de diagnostische fase kan de psychiater zorgactiviteit 036870 *Tentatieve diagnostische fase genderincongruentie* vastleggen voor afleiding naar dbc-zorgproduct 059899065 *Incongruentie genderidentiteit | Diagnostisch | Psychische stoornis*.

## OVERIGE WIJZIGINGEN

RZ17B BLZ. 30 - GENDERDYSFORIE: (KINDER)PSYCHIATER KRIJGT TOEGANG TOT ZORGPRODUCTGROEP 059899 (202333)

De diagnosetyperingslijsten van kindergeneeskunde, inwendige geneeskunde en gynaecologie bevatten de diagnose *Incongruentie genderidentiteit* waarmee afleiding naar dbc- zorgproducten voor gender kan plaatsvinden.

De psychiater kon deze dbc-zorgproducten niet registreren. De psychiater doet met name bij kinderen de screening en diagnostiek. De dbc-zorgproducten voor gender leiden af op basis van de diagnose *Incongruentie genderidentiteit* bij de gynaecoloog, kinderarts en internist, deze diagnose had de psychiater niet. Zie blz. 31 RZ17b voor de situatie vóór de wijziging in RZ17b.

RZ17B BLZ. 6 WIJZIGINGEN NADERE REGEL

RZ17a	RZ17b	Wijziging
<p><u>NR artikel 19 lid 16 onderdeel a</u>  <i>Incongruentie gender (1.0000.10)</i>            Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel) zorgtraject geopend. De conservatieve behandeling bestaat uit 3 fasen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screeningstraject</li> <li>2. Diagnostiek genderidentiteitsstoornis</li> <li>3. Real life of hormonale behandeling</li> </ol> <p>a. Binnen een subtraject voor fase 1 dient bij het eerste face-to-face contact met de medisch psycholoog de zorgactiviteit 194162 'intake face-to-face medisch psycholoog' geregistreerd te worden.</p>	<p><u>NR artikel 19 lid 16 onderdeel a</u>  <i>Incongruentie gender (1.0000.10)</i>            Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart (bij gynaecologie zo nodig parallel) zorgtraject geopend. De conservatieve behandeling bestaat uit 3 fasen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screeningstraject</li> <li>2. Diagnostiek genderidentiteitsstoornis</li> <li>3. Real life of hormonale behandeling</li> </ol> <p>a. Binnen een subtraject voor fase 1 dient bij het eerste face-to-face contact met de poortspecialist de zorgactiviteit 036872 'intake bij incongruentie van genderidentiteit' vastgelegd te worden. Bij het eerste face-to-face contact met de medisch psycholoog dient de zorgactiviteit 194162 'intake face-to-face contact medisch psycholoog' vastgelegd te worden.</p>	<p>De psychiater heeft geen toegang tot de gender zorgproducten. Met het aanmaken van de zorgactiviteit 036872 'Intake incongruentie van genderidentiteit' wordt deze toegang mogelijk gemaakt.</p> <p>Wijzigingsverzoek nummer: 202333.</p>